

conopode dénudé - grand conopode



Nom latin : *Conopodium denudatum*

Famille : Apiaceae

Description suivant la Flore de l'abbé Hippolyte Coste


1624 . - *Conopodium denudatum* Koch. Janoltes, Génottes.

Plante vivace de 20 à 60 cm., glabre, à racine renflée en bulbe arrondi; tige grêle, striée, nue et flexueuse intérieurement, simple ou un peu rameuse au sommet; feuilles bitripennatiséquées, les inférieures triangulaires dans leur pourtour, à lobes lancéolés-linéaires, les caulinaires à lanières linéaires; fleurs blanches, en ombelles à 7 à 12 rayons, grêles, glabres; involucre nul ou a, 1 à 2 folioles; involucelle à 2 à 8 folioles linéaires; calice à limbe nul; pétales égaux, obovales, émarginés, à pointe courbée; styles dressés sur un stylopode conique; fruit ovoïde-oblong, comprimé par le côté, atténué au sommet, sans bec, glabre, luisant, noir à la maturité; méricarpes à 5 côtes égales, filiformes, obtuses; graine à face commissurale canaliculée.

Varie à feuilles grandes, décroissantes de bas en haut, à segments oblongs en coin, ombelle à rayons inégaux (C. MUTABILE et C. PYRENAEUM Miég.; C. RICHTERI Rouy).

Prés et bois des terrains siliceux, dans l'Ouest, le Centre et le Midi; Corse: la var. dans les Pyrénées.
Europe occidentale: Italie, Espagne et Portugal, Grande-Bretagne, Norvège.

= Juin à juillet.



- Tubercules comestibles.

