Limodore à feuilles avortées











Nom latin : Limodorum abortivum

Famille : Orchidaceae

Description suivant la Flore de l abbé Hippolyte Coste

3626. ? Limodorum abortivum Swartz.

- Plante vivace de 30 - 80 cm., glabre, d'un violet livide, à fibres radicales profondes, nombreuses, épaisses; tige robuste, sans feuilles, munie d'écaillés engainantes; fleurs violettes à stries plus foncées, grandes, dressées, en épi long et lâche; bractées grandes, égalant ou
dépassant l'ovaire; périanthe ouvert, à divisions conniventes, lancéolées, les 2 intérieures plus petites ; labelle un peu plus court que les divisions, dirigé en
avant, subarticulé, rétréci vers la base, à languette oblongue ou ovoïde concave, crénelée, à éperon en alêne, dirigé en bas, aussi long que l'ovaire; anthère libre, mobile, persistante; 2 pollinies pulvérulentes, indivises, sessiles, réunies par un rétinacle commun: ovaire non contourné.

Varie (Loire-Inférieure, Algérie) à labelle petit, spatule, non articulé, éperon assez court (2 mm.) :
L . TRABUTIANUM Battandier.

Clairières des bois montueux, parasite sur les racines des arbres, dans presque toute la France et en Corse.
? Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

= Mai-juillet.



Limodorum abortivum